

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

+1 Берн

218326

Шифр

(заполняется ответственным секретарем приемной комиссии)

ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА
на олимпиаде «Шаг в будущее»

соревнования по образовательному предмету по математике
(наименование дисциплины)

Фамилия И. О. участника Шуцкий Эдгар Александрович

Город, № школы (образовательного учреждения) ТБОУ "Лицей" МХМ им. В.Н. Тельмана г. Байконур
11 класс

Регистрационный номер ШМ6928

Вариант задания 17

Дата проведения " 11 " марта 20 18 г.

Подпись участника Шуцкий

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
12	12	16	20	25						65


Шифр _____

(заполняется ответственным секретарем приёмной комиссии)

Вариант № 17

N1

Дано 5 разноцветных кусков, обозначим их цветом "1"; "2"; "3"; "4" и "5".
 Будет ли как-то такой вид сверху, что цвета 5 не видно, например



Вид сверху 5 кусок отсутствует!

- 1) Рассчитаем число способов вставить плитку 5 так, чтобы ее не было видно сверху
 5-й треугольник под первым, 4 способа
 5-й под вторым, 3 способа
 5-й под третьим, 2 способа
 5-й под четвертым, 1 способ

$$\frac{(4+1) \cdot 4}{2} = 10 \text{ способов}$$

2) $4!$ способов переставить 1, 2, 3 и 4 плитки по вершинам


3) $\frac{4!}{4} = 3!$ способов менять порядок цветов сверху

4) Всего 5-го может быть еще 4 цвета \Rightarrow Всего $5 \cdot 10 \cdot 4! \cdot 3! = 50 \cdot 36 \cdot 4 = 7200$ способов

Ответ: 7200 способов

12

N3



Дано: $S_{ADE} = 0,5$

$AK = 3$

$BC = 15$

Около BCDE можно описать окружность

И/или:

$\text{tg} \angle BAC = ?$

Решение:

1. ~~Касательные к касательной окружности~~ кас. DE Разобьем точки касания окружности: кас DE в (1)-м месте EC в точке H, BC в точке G. По ~~теор.~~ о касательной $AK = AH = 3$; $DK = DF$; $EH = EG$

$P_{ADE} = AD + DF + FE + AE = AD + DK + AE + EH = AK + AH = 6$

По теор. о касат. $BK = BG$; $HC = GE$

$P_{ABE} = AK + BK + BG + GC + CH + AH = AK + AH + 2(BG + GC) = 6 + 2 \cdot BC = 36$

2. Около BDEC можно описать окружность $\Rightarrow \angle D + \angle C = \angle B + \angle E = 180^\circ$. Также $\angle BDE + \angle EDA = \angle CED + \angle EDC = 180^\circ \Rightarrow \angle C = \angle ADE$; $\angle B = \angle AED$

3. $\angle ADE = \angle C$; $\angle B = \angle AED$, $\angle A$ - общ. $\Rightarrow \triangle HDE \sim \triangle ACB$, кор. подобия: $\frac{P_{ABC}}{P_{ADE}} = \frac{36}{6} = 6 \Rightarrow$

$\Rightarrow \frac{AB}{AE} = \frac{AC}{AD} = \frac{BC}{DE} = 6 \Rightarrow S_{ABC} = 0,5 \cdot 6^2 = 18$

$DE = \frac{BC}{6} = 2,5$

4. $\triangle ABC$: $S = 18$; $p = \frac{P}{2} = 18$; $AB + AC = 21$; $BC = 15$

По ф. Герона:

$18^2 = 18 \cdot 3(18 - AB)(18 - AC)$

$6 = 18^2 - 18AB - 18AC + AB \cdot AC = 18^2 - 18(AB + AC) + AB \cdot AC = 18^2 - 18 \cdot 21 + AB \cdot AC$

$6 + 54 = AB \cdot AC \Rightarrow AB \cdot AC = 60$

5. $\sin A = \frac{2S_{ABC}}{AB \cdot AC} = \frac{36}{60} = 0,6$

$AB^2 + AC^2 = (AB + AC)^2 - 2AB \cdot AC = 441 - 120 = 321$

По теор. косинусов:

$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos A$

$15^2 = 321 - 2 \cdot 60 \cdot \cos A$

$\Rightarrow 120 \cos A = 321 - 225 = 96$

$\cos A = \frac{4}{5} = 0,8$

6. $\text{tg} A = \frac{0,6}{0,8} = 0,75$

Ответ: $\text{tg} \angle BAC = 0,75$

16

15

14

$$\frac{2}{3} g\left(\frac{g(x)}{3}\right) + 2\sqrt{2 - \frac{3}{g(x)}} \geq 5 \log(g^2(x)), \text{ где } g(x) = \frac{3}{x^2 - 4x + 5}$$

$$g(x) = \frac{3}{x^2 - 4x + 5} = (x-2)^2 + 1$$

$$\text{или: } 2 - (x^2 - 4x + 5) \geq 0$$

$$(3-x)(x-1) \geq 0$$

$$(x-3)(x-1) \leq 0 \Rightarrow x \in [1; 3]$$

$g(x-2)$ — четная функция \Rightarrow можно рассматривать только отрезок $x \in [1; 2]$, где функция $g(x)$ монотонно возрастает, а $\frac{2}{3}g\left(\frac{g(x)}{3}\right)$ монотонно убывает симметрично относительно $x=2$ решения.

$$E(g([1; 2])) = \left[\frac{3}{2}; 3\right]$$

$$\frac{g(x)}{3} < 2 \Rightarrow \frac{2}{3}g\left(\frac{g(x)}{3}\right) \text{ монотонно возрастает на } x \in [1; 2]$$

$$\text{Аналогично } 2 - \frac{3}{g(x)}$$

$$E\left(\frac{2}{3}g\left(g\left(\frac{[1; 2]}{3}\right)\right)\right) = E\left[\frac{2}{3}[1; 3]\right] = \left[\frac{2}{3}; 1\right]$$

$$E\left(2\sqrt{2 - \frac{3}{g([1; 2])}}\right) = [0; 2]$$

$$E(g^2([1; 2])) = \left[\frac{9}{4}; 9\right]$$

$$E(5 \log(g^2([1; 2]))) = \left[3; 50 \cdot \frac{3}{10+1}\right]$$

$$\Rightarrow E\left(\frac{2}{3}g\left(\frac{g(x)}{3}\right) + 2\sqrt{2 - \frac{3}{g(x)}}\right) = \left[\frac{8}{13}; 3\right] \text{ при } x \in [1; 2]$$

$$\text{а } E(5 \log(g^2(x))) = \left[3; 50 \cdot \frac{48}{74}\right]$$

\Rightarrow пересекаются только в точке $x=2$ (значение

$x=2$ симметрично самой себе относительно $x=2$

\Rightarrow равенство только $x=2$

Ответ: $x=2$

20

12

$$\sin^4(2025x) + \cos^{2019}(2016x) \cdot \cos^{2018}(2025x) = 1$$

$$(1 - \cos^2(2025x))^2 + \cos^{2019}(2016x) \cdot \cos^{2018}(2025x) = 1$$

$$\cos^2(2025x) (\cos^2(2025x) + \cos^{2019}(2016x) \cdot \cos^{2018}(2025x) - 2) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \cos^2(2025x) = 0 \\ \cos^{2019}(2016x) + \cos^{2018}(2016x) \cdot \cos^{2018}(2025x) - 2 = 0 \end{cases}$$

$$1) \cos(2025x) = 0$$

$$2025x = \frac{\pi}{2} + \pi k$$

$$x = \frac{\pi}{4050} + \frac{\pi k}{2025}, k \in \mathbb{Z}$$

$$2) \cos^2(2025x) \leq 1$$

$$|\cos^{2019}(2016x) \cdot \cos^{2018}(2025x)| \leq 1$$

$$\begin{cases} \cos^2(2025x) = 1 \\ \cos^{2019}(2016x) = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} \cos(2025x) = \pm 1 \\ \cos^{2019}(2016x) = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2025x = \pi n \\ 2016x = 2\pi m \end{cases} \quad n, m \in \mathbb{Z}$$

$$\text{НОД}(2025; 2016) = \text{НОД}(2016; 9) = 9, \text{ м.ч. } 2+1+6=9 \text{ (кратное: } \pi \text{ и } 9)$$

$$\begin{cases} 225 \cdot 9x = \pi n \\ 224 \cdot 9x = 2\pi m \end{cases}$$

$$\frac{225}{112} = \frac{n}{m}$$

$$n = 225k$$

$$m = 112k$$

$$9x = \pi k, k \in \mathbb{Z}$$

$$x = \frac{\pi k}{9}, k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{Ответ: } x = \frac{\pi}{4050} + \frac{\pi k}{2025}; x = \frac{\pi k}{9}, k \in \mathbb{Z}$$

✓6.

(12)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

218326

Шифр _____

(заполняется ответственным секретарем приёмной комиссии)

Вариант № 17



Решение:

1) строим сечение методом следов:

РКМС-сечение


$$AA_1 = h$$

$\triangle D A_1 N$: $AD = CC_1 = AA_1$, т.к. $AC_1 \parallel DN$, $AD \parallel CC_1$ и $\triangle D A_1 N$ - параллелограмм

2) $A_1 T = TA$, $OT \parallel AB$, $OT = \frac{a}{2}$

$$\triangle DAP \sim \triangle DTO \Rightarrow \frac{AP}{a/2} = \frac{h}{3h/2} \Rightarrow AP = \frac{a}{3}$$

Итого сечению: $A_1 K = \frac{2a}{3}$



По теореме Менелая

$$\frac{A_1K}{KB_1} \cdot \frac{B_1M}{M_1N} \cdot \frac{C_1N}{A_1N} = 1$$


$$2 \cdot \frac{B_1M}{MC_1} \cdot \frac{1}{2} = 1 \Rightarrow B_1M = MC_1 = \frac{a}{2} \quad +$$

По теореме Пифагора:

$$KM^2 = \left(\frac{a}{3}\right)^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 - \frac{a}{3} \cdot \frac{a}{2} = \frac{a^2}{9} + \frac{a^2}{4} - \frac{a^2}{6} = \frac{7a^2}{36} \quad +$$

$$KM = \frac{\sqrt{7}}{6}a$$

3)



По т. кос-ов

$$PC^2 = \frac{a^2}{9} + a^2 - \frac{a^2}{3} = \frac{7}{9}a^2$$

$$PC = \frac{\sqrt{7}}{3}a$$

$$S_{PKMC} = 21 \text{ (по условию)}$$

KM || PC и эти две прямые параллельны, а они лежат в одной плоскости

\Rightarrow PKMC - трапеция

$$S_{PKMC} = \left(\frac{PC + KM}{2}\right) \cdot h', \text{ где } h' - \text{высота трапеции}$$

$$21 = \frac{1}{2} \cdot h' \cdot \left(\frac{\sqrt{7}}{3} + \frac{\sqrt{7}}{6}\right)a = \frac{\sqrt{7}}{6}h' \cdot \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2}\right)a = \frac{7}{2} \cdot 6 \sqrt{7}h'a = \frac{\sqrt{7}h'a}{4}$$

$$h' = \frac{21 \cdot 4}{\sqrt{7}a} = \frac{21 \cdot 4}{\sqrt{7} \cdot 21} = \frac{6}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{2}$$

4) По теореме Пифагора

$$MC = \sqrt{h'^2 + a^2}$$

$$PK = BP = \sqrt{h'^2 + \frac{7a^2}{9}}$$


5

$$KM = \frac{14}{3}\sqrt{2}$$

$$PC = \frac{14}{3}\sqrt{2}$$

$$\begin{cases} h^2 + 14 = 18 + y^2 \\ h^2 + \frac{14}{9} = 18 + 1^2 \\ x + y = \frac{14}{3}\sqrt{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{8}{9} \cdot 14 = y^2 - 1^2 \\ y = \frac{14}{3}\sqrt{2} - 1 \end{cases}$$



$$\frac{8}{9} \cdot 14 = \frac{2}{36} \cdot 4 \cdot 49 - \frac{14}{3}\sqrt{2} + 1$$

$$\frac{8}{9} = \frac{28}{36} - \frac{\sqrt{2}}{3} + 1 - 36$$

$$32 = 28 - 12\sqrt{2}x \Rightarrow x = -\frac{1}{3\sqrt{2}}$$

$$h^2 + \frac{14}{9} = 18 + 1^2$$

$$h^2 + \frac{14}{9} = 18 + \frac{1}{18}$$

$$h^2 = 18 + \frac{1}{18} - \frac{14}{9}$$

$$h^2 = 18 + \frac{1}{18} - \frac{28}{18}$$

$$h^2 = 18 - \frac{24}{18}$$