

**Первый (заочный) онлайн-этап академического соревнования
Олимпиады школьников «Шаг в будущее» по общеобразовательному предмету
«Математика», осень 2020 г.**

10 класс

Вариант 1

№1. Найти наименьшее значение многочлена $f(x) = x(x + 1)(x + 2)(x + 3)$.

№2. Расстояние от дома Пети в городе А до домика бабушки в посёлке В равно 50 км. Петя на велосипеде поехал навестить бабушку. Дома отец обнаружил, что Петя забыл приготовленные для бабушки лекарства и через час после выезда Пети отправился догонять его на автомобиле со скоростью 75 км/ч. Догнав Петю и передав лекарства, отец сразу же повернул обратно. Так получилось, что отец вернулся домой в тот же момент времени, когда Петя доехал до бабушки. На каком расстоянии от домика бабушки отец догнал Петю? Ответ дайте в километрах. При решении задачи считайте, что и автомобиль и Петя на велосипеде всё время движутся с постоянными скоростями.

№3. Одна из сторон треугольника равна 34, а косинусы углов, прилежащих к этой стороне, равны $\frac{15}{17}$ и $\frac{8}{17}$. Найдите периметр треугольника.

№4. Найдите сумму всех трёхзначных чисел, не делящихся на 13.

№5. Имеется три куска сплава меди с никелем в отношениях 2:1, 3:1 и 5:1 по массе. Из них сплавлен кусок массой 12 кг с отношением содержания меди и никеля 4:1. Найдите массу третьего куска, если масса первого из них в два раза больше массы второго.

№6. Нечётная функция $y = f(x)$ определена на всей числовой прямой. Для каждого неположительного значения аргумента x значение этой функции на 9 меньше, чем значение функции $g(x) = (x^2 + 2x - 3)^2$. Найдите число корней уравнения $f(x) = 0$.

№7. Окружности радиусов r_1, r_2, r_3, r_4 ($r_1 < r_2 < r_3 < r_4$) вписаны в угол. Каждая следующая окружность касается предыдущей окружности. Найдите $\frac{L_2 + L_3}{\pi}$, где $L_2 + L_3$ - сумма длин второй и третьей окружностей, если длина радиуса первой окружности равна $r_1 = 1$, а площадь круга ограниченного четвертой окружностью с радиусом r_4 , равна 64π .

№8. Найдите, при каких значениях параметра a уравнение $\frac{x^2 - 4x + a(a-2)}{\sqrt{x+a}-2} = 0$ имеет два различных корня. В ответе укажите количество целочисленных значений a , удовлетворяющих условию задачи.

№9. Ваня, долго умножая, вычислил 2020! В числе, полученном Ваней, Ксюша слева направо расставила знаки действий: между первой и второй цифрами знак «-», между второй и третьей цифрами знак «+», между третьей и четвертой – «-», и так далее, до конца. Затем Ваня вычислил результат этих действий. В полученном Ваней числе Ксюша опять расставила между цифрами знаки «-» и «+» по такому же правилу. После этого Ваня опять вычислил результат, и так далее. После некоторого количества таких операций было получено однозначное число. Какое?
($n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$)

Решение варианта 1

№1. Найти наименьшее значение многочлена $f(x) = x(x + 1)(x + 2)(x + 3)$.

Решение.

Перемножая крайние и средние скобки, получим $f(x) = (x^2 + 3x)(x^2 + 3x + 2)$, далее, вводя обозначение $y = x^2 + 3x + 1$, получим $f(x) = (y - 1)(y + 1) = y^2 - 1 \geq -1$, причем наименьшее значение -1 будет достигаться при $y = 0$, т.е. при $x = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}$.

Ответ: -1 .

№2. Расстояние от дома Пети в городе А до домика бабушки в посёлке В равно 50 км. Петя на велосипеде поехал навестить бабушку. Дома отец обнаружил, что Петя забыл приготовленные для бабушки лекарства и через час после выезда Пети отправился догонять его на автомобиле со скоростью 75 км/ч. Догнав Петю и передав лекарства, отец сразу же повернул обратно. Так получилось, что отец вернулся домой в тот же момент времени, когда Петя доехал до бабушки. На каком расстоянии от домика бабушки отец догнал Петю? Ответ дайте в километрах. При решении задачи считайте, что и автомобиль и Петя на велосипеде всё время движутся с постоянными скоростями.

Решение.

Обозначим t – время, которое был в пути Петя до встречи с отцом. Составим систему уравнений по условию задачи.

$$\begin{cases} v \cdot t = 75(t - 1) \\ v(t - 1) = 50 - v \cdot t \end{cases} \quad \begin{cases} 2v \cdot t = 150(t - 1) \\ 2v \cdot t = 50 + v \end{cases}; \quad 150t - 150 = 50 + v; \quad v = 150t - 200;$$

$$t(150t - 200) = 75(t - 1); \quad 6t^2 - 11t + 3 = 0; \quad t_{1,2} = \frac{11 \pm 7}{12} = \begin{cases} 1,5 \\ \frac{1}{3} < 1 \end{cases} \quad \text{не удовлетворяет условию задачи.}$$

$v = 150 \cdot 1,5 - 200 = 25 \text{ км / ч}; \quad 50 - 25 \cdot 1,5 = 12,5 \text{ км.}$

Ответ: 12,5.

№3. Одна из сторон треугольника равна 34, а косинусы углов, прилежащих к этой стороне, равны

$\frac{15}{17}$ и $\frac{8}{17}$. Найдите периметр треугольника.

Решение:

1) Для решения задачи проведём дополнительное построение: $BD \perp AC$

$$2) \quad \begin{aligned} \operatorname{tg}(\angle A) &= \frac{BD}{AD} = \frac{\sin(\angle A)}{\cos(\angle A)}; \quad \sin(\angle A) = \sqrt{1 - \cos^2(\angle A)}; \quad \sin(\angle A) = \sqrt{1 - \left(\frac{15}{17}\right)^2} = \frac{8}{17}; \\ \operatorname{tg}(\angle A) &= \frac{8}{17} : \frac{15}{17} = \frac{8}{15} \end{aligned}$$

$$3) \quad \begin{aligned} \operatorname{tg}(\angle C) &= \frac{BD}{DC} = \frac{\sin(\angle C)}{\cos(\angle C)}; \quad \sin(\angle C) = \sqrt{1 - \left(\frac{8}{17}\right)^2} = \frac{15}{17}; \quad \operatorname{tg}(\angle C) = \frac{15}{17} : \frac{8}{17} = \frac{15}{8} \end{aligned}$$

$$4) \quad BD = AD \cdot \operatorname{tg}(\angle A) \quad \text{и} \quad BD = DC \cdot \operatorname{tg}(\angle C). \quad \text{Значит} \quad AD \cdot \frac{8}{15} = DC \cdot \frac{15}{8}.$$

Так как $DC = AC - AD$, т.е. $DC = 34 - AD$, то $AD \cdot \frac{8}{15} = (34 - AD) \cdot \frac{15}{8}$. Значит

$$64AD = (34 - AD) \cdot 15^2; \quad (64 + 225)AD = 34 \cdot 15^2; \quad AD = \frac{34 \cdot 15^2}{289} = \frac{2 \cdot 15^2}{17}.$$

$$5) \quad AB = \frac{AD}{\cos(\angle A)}, \quad \text{то есть} \quad AB = \frac{2 \cdot 15^2}{17} : \frac{15}{17} = 2 \cdot 15 = 30.$$

$$6) \quad BC = \sqrt{AC^2 + AB^2 - 2AC \cdot AB \cdot \cos(\angle A)};$$

$$7) \quad P_{\triangle ABC} = AB + BC + AC = 30 + 16 + 34 = 80$$

Ответ: 80

№4. Найдите сумму всех трёхзначных чисел, не делящихся на 13.

Решение:

Рассмотрим две последовательности, которые являются арифметическими прогрессиями. Первая – это последовательность трёхзначных натуральных чисел, вторая – последовательность натуральных трёхзначных чисел кратных тринадцати. Разность сумм этих прогрессий и есть искомая величина.

Всего трёхзначных чисел $999 - 100 + 1 = 900$. В первой прогрессии $a_1 = 100$, $a_{900} = 999$, $d = 1$.

$$S = \frac{a_1 + a_{900}}{2} \cdot n = \frac{100 + 999}{2} \cdot 900 = 494550$$

Во второй прогрессии первый элемент, кратный 13

это 104. $b_1 = 104$, $b_n = b_1 + (n-1) \cdot d$, $b_n < 1000$, $b_1 + (n-1) \cdot 13 < 1000$,
 $104 + 13n - 13 < 1000$, $13n < 909$, так как $n \in \mathbb{Z}$,

$$n = 69, \quad S = \frac{2 \cdot 104 + (69-1)13}{2} \cdot 69 = 37674$$

Вычитая из первой суммы вторую, получим, что трёхзначных чисел не кратных 13 456876

Ответ: 456876.

№5. Имеется три куска сплава меди с никелем в отношениях 2:1, 3:1 и 5:1 по массе. Из них сплавлен кусок массой 12 кг с отношением содержания меди и никеля 4:1. Найдите массу третьего куска, если масса первого из них в два раза больше массы второго.

Решение:

Пусть масса второго куска x кг, тогда масса первого куска $2x$ кг, а масса третьего куска y кг.

	Медь	Никель
1 кусок	$\frac{2}{3} \cdot 2x$	$\frac{1}{3} \cdot 2x$
2 кусок	$\frac{3}{4} \cdot x$	$\frac{1}{4} \cdot x$
3 кусок	$\frac{5}{6} \cdot y$	$\frac{1}{6} \cdot y$

Масса нового сплава $2x + x + y = 12$, масса меди и никеля в нём $\frac{4}{5} \cdot 12 = \frac{48}{5}$ и $\frac{1}{5} \cdot 12 = \frac{12}{5}$ соответственно.

$$\begin{cases} 3x + y = 12 \\ \frac{2}{3} \cdot 2x + \frac{3}{4}x + \frac{5}{6}y = 9,6 \\ \frac{2}{3}x + \frac{1}{4}x + \frac{1}{6}y = 2,4 \end{cases};$$

$$\begin{cases} 16x + 9x + 10y = 115,2 \\ y = 12 - 3x \end{cases}; \begin{cases} 25x + 10y = 115,2 \\ y = 12 - 3x \end{cases}; \quad 25x + 120 - 30x = 115,2;$$

$$-5x = -4,8; \quad x = 0,96 \quad \text{масса второго куска, } 1,92 \text{ – масса первого куска, } y = 12 - 3x = 9,12 \text{ –}$$

масса третьего куска.

Ответ: 9,12 кг.

№6. Нечётная функция $y = f(x)$ определена на всей числовой прямой. Для каждого неположительного значения аргумента x значение этой функции на 9 меньше, чем значение функции $g(x) = (x^2 + 2x - 3)^2$. Найдите число корней уравнения $f(x) = 0$.

Решение: при $x \leq 0$ $f(x) = (x^2 + 2x - 3)^2 - 9$. Решим уравнение


$$(x^2 + 2x - 3)^2 - 3^2 = 0; \quad (x^2 + 2x - 6)(x^2 + 2x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 2x - 6 = 0 \\ x^2 + 2x = 0 \end{cases};$$

$x_{1,2} = -1 \pm \sqrt{7}; x_3 = 0; x_4 = -2$. $-1 + \sqrt{7} > 0$ – не подходит. В силу нечётности функции для каждого отрицательного корня противоположное ему положительное число – тоже корень. Поэтому корнями уравнения являются числа: $0; -1 - \sqrt{7}; 1 + \sqrt{7}; \pm 2$. Всего 5 корней.

Ответ: 5.

№7. Окружности радиусов r_1, r_2, r_3, r_4 ($r_1 < r_2 < r_3 < r_4$) вписаны в угол. Каждая следующая окружность касается предыдущей окружности. Найдите $\frac{L_2 + L_3}{\pi}$, где $L_2 + L_3$ – сумма длин второй и третьей окружностей, если длина радиуса первой окружности равна $r_1 = 1$, а площадь круга ограниченного четвертой окружностью с радиусом r_4 , равна 64π .

Решение.



Обозначим центры окружностей O_1, O_2, O_3, O_4 , вершину угла обозначим A , точки касания окружностей с одной из сторон угла обозначим H_1, H_2, H_3, H_4 . Построим отрезки O_1P_2, O_2P_3, O_3P_4 , параллельные стороне угла, на которой лежат точки H_1, H_2, H_3, H_4 , так, что $P_2 \in O_2H_2, P_3 \in O_3H_3, P_4 \in O_4H_4$. Тогда

$$|O_1O_2| = r_1 + r_2, |O_2O_3| = r_2 + r_3, |O_3O_4| = r_3 + r_4,$$

$$|O_2P_2| = r_2 - r_1, |O_3P_3| = r_3 - r_2, |O_4P_4| = r_4 - r_3.$$

Треугольники $O_1P_2O_2$ и $O_2P_3O_3, O_2P_3O_3$ и $O_3P_4O_4$ подобны. Из первого подобия получаем $\frac{|O_2P_2|}{|O_3P_3|} =$

$$\frac{|O_1O_2|}{|O_2O_3|} \cdot \frac{r_2 - r_1}{r_3 - r_2} = \frac{r_2 + r_1}{r_3 + r_2}, r_2^2 = r_1 r_3.$$

Таким образом, числа r_1, r_2, r_3 образуют геометрическую прогрессию. Аналогично из второго подобия получаем $r_3^2 = r_2 r_4$. Числа r_2, r_3, r_4 также образуют геометрическую прогрессию. Следовательно, **все четыре числа r_1, r_2, r_3, r_4 образуют геометрическую прогрессию.**

В нашей задаче $r_1 = 1, \pi r_4^2 = 64\pi$ или $r_4 = 8$. Тогда $r_2 = 2, r_3 = 4$. Далее

$$\frac{L_2 + L_3}{\pi} = \frac{2\pi r_2 + 2\pi r_3}{\pi} = 2(r_2 + r_3) = 12.$$

Ответ: 12.

№8. Найдите, при каких значениях параметра a уравнение $\frac{x^2 - 4x + a(a-2)}{\sqrt{x+a}-2} = 0$ имеет два различных корня. В ответе укажите количество целочисленных значений a , удовлетворяющих условию задачи.

Ответ: 3.

$$\begin{cases} x^2 - 4x + a^2 - 2a = 0 \\ x + a \geq 0, x \geq -a \\ x + a \neq 4, x \neq 4 - a \end{cases}$$

Решение: Исходное уравнение равносильно системе

Переформулируем задачу. Надо найти такие значения параметра, при которых квадратное уравнение системы имеет два различных корня $\geq -a$ и не совпадающих с $(4 - a)$.

Найдём, при каких значениях a один из корней уравнения (или оба) совпадают с числом $(4 - a)$

$$(4 - a)^2 - 4(4 - a) + a^2 - 2a = 16 - 8a + a^2 - 16 + 4a + a^2 - 2a = 2a^2 - 6a = 0;$$

$$a_1 = 0; a_2 = 3.$$

То, что уравнение имеет два различных корня $\geq a$ задаётся следующей системой условий

$$\begin{cases} D > 0 \\ x_b > -a \\ f(-a) \geq 0; (1) \end{cases} \quad \frac{D}{4} = 4 - a^2 + 2a > 0 \Leftrightarrow a^2 - 2a - 4 < 0; \quad a \in (1 - \sqrt{5}; 1 + \sqrt{5}); \quad x_b = 2;$$

$f(-a) = a^2 + 4a + a^2 - 2a = 2a^2 + 2a \geq 0; \quad a \in (-\infty; -1] \cup [0; +\infty);$ Система (1) равносильна

$$\begin{cases} a \in (1 - \sqrt{5}; 1 + \sqrt{5}) \\ a \in (-2; +\infty) \\ a \in (-\infty; -1] \cup [0; +\infty) \Leftrightarrow a \in (1 - \sqrt{5}; -1] \cup [0; 1 + \sqrt{5}). \end{cases}$$

системе

Исключив из этого промежутка особое значение параметра – число 0, получим множество значений a , удовлетворяющих условию задачи:

$a \in (1 - \sqrt{5}; -1] \cup (0; 1 + \sqrt{5})$. Целочисленные значения параметра, входящие в ответ: -1, 1 и 2, всего 3 значения.

Ответ: 3.

№9. Ваня, долго умножая, вычислил $2020!$ В числе, полученном Ваней, Ксюша слева направо расставила знаки действий: между первой и второй цифрами знак «-», между второй и третьей цифрами знак «+», между третьей и четвертой – «-», и так далее, до конца. Затем Ваня вычислил результат этих действий. В полученном Ваней числе Ксюша опять расставила между цифрами знаки «-» и «+» по такому же правилу. После этого Ваня опять вычислил результат, и так далее. После некоторого количества таких операций было получено однозначное число. Какое?

($n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$)

Решение.

Число $2020!$ кратно 11. Известно, что число кратно 11 тогда и только тогда, когда разность двух сумм цифр в его десятичной записи: стоящих на нечетных местах и стоящих на четных местах, кратна 11. Поэтому комбинация цифр, составленная Ксюшей, опять дает число кратное 11, и так далее. Таким образом, каждое из чисел, получаемых в результате описанных операций, кратно 11. Существует единственное однозначное число, кратное 11, это число 0.

Ответ: 0.